

**การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอบเชยเถาและเถาประสงค์**  
**Determination of Antioxidant Activity of *Atherolepis pierrei* and**  
***Streptocaulon juvenus***

สุวรรณ จันคณา<sup>1</sup>

Suwanna Jankana<sup>1</sup>

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากอบเชยเถาและเถาประสงค์ โดยนำลำต้นของอบเชยเถา และใบของเถาประสงค์ มาสกัดร่อนด้วยเครื่องสกัดชอกเลต (soxhlet extraction) ตัวทำละลายที่ใช้คือ เฮกเซน (hexane) ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) เอทิลอะซิเตท (ethyl acetate) และเอทานอล (ethanol) ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตท และสารสกัดหยาบเอทานอล โดยอบเชยเถามีเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบต่อน้ำหนักพืชแห้งคือ 7.79, 0.71, 2.13 และ 33.56% ตามลำดับ ในขณะที่เถาประสงค์มีเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบต่อน้ำหนักพืชแห้งคือ 5.70, 2.32, 1.74 และ 9.13% ตามลำดับ นำสารสกัดหยาบทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยวิธี TLC (Thin Layer Chromatography) และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณวิเคราะห์ใช้วิธี DPPH radical scavenging assay พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของอบเชยเถาและเถาประสงค์ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่า  $IC_{50}$  เท่ากับ 2.64 และ 4.35  $\mu\text{g/ml}$  ตามลำดับ ในขณะที่วิตามินซีมีค่า  $IC_{50}$  เท่ากับ 2.61  $\mu\text{g/ml}$

**คำสำคัญ :** การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อบเชยเถา เถาประสงค์ วิธี DPPH radical scavenging assay

<sup>1</sup>อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

<sup>1</sup>Lecturer. Faculty of Sciences. Buriram Rajabhat University.



The purpose of this research is to determinate of antioxidant activity of *atherolepis pierrei* and *streptocaulon juvenus* by taking the trunk of *atherolepis pierrei* to extract with soxhlet extraction. The destructors were hexane, dichloromethane, ethyl acetate, and ethanol. In doming so, the rough hexan, dichloromethane, ethyl acetate, and ethanol extraction were gotten which *atherolepis pierrei* obtained rough extrac-tion percentage per plant dry weight were 7.79, 0.71, 2.13 and 33.56 %, respectively; whereas, the *streptocaulon juvenus* was 5.70, 2.32, 1.74, and 9.13%, respectively. All of rough extractions were determinate with two techniques: qualitative analysis by using TLC (Thin Layer Chromatography), and quantitative analysis by using DPPH radical scavenging assay. The findings revealed that the rough extractions of ethanol of *atherolepis pierrei* and *streptocaulon juvenus* acted to determinate of antioxidant activity with  $IC_{50}$  values equaled 2.64 and 4.35  $\mu\text{g/ml}$ , respectively; whereas,  $IC_{50}$  value of vitamin C equaled 2.61  $\mu\text{g/ml}$

**Keywords :** determinate of antioxidant activity, *atherolepis pierrei*, *streptocaulon juvenus*

อบเชยเถา มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ *Atherolepis pierrei* Cost.var.glabra อยู่ในวงศ์ ASCLEPIADACEAE มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้ กำหยาน กูติน เครือเขาใหม่ เชือกเถา อบเชยป่า มีลักษณะเป็นไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อยพันต้นไม้อื่น ใบเหม็นเขียว มีเส้นใบและลายใบเป็นสีขาว รากมีกลิ่นหอม (ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย, 2010) ขึ้นตามป่าราบทั่วไปเกือบทุกภาค ใช้เป็นอาหารโดยพลออ่อนกินดิบหรือต้มกินกับน้ำพริกต่างๆ หรือนำมาต้มน้ำดื่มให้รสหวานอบเชยเถามีสรรพคุณเป็นยาหอม เป็นยาขับลมในลำไส้ แก้ปวดมวนท้อง แก้ลมวิงเวียน บำรุงหัวใจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ม.ป.ป) แก้กโรคผิวหนัง ผื่นคัน หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2010.) ได้มีการศึกษาทางเคมีของรากอบเชยเถาพบสาร 5 ชนิด ซึ่งเป็น สารไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติกอัลดีไฮด์ และไตรเทอร์พีนอยด์ (Chansakaow S., et al, 1993 ) เถาประสงค์มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ *Streptocaulon juvenis* Merr. อยู่ในวงศ์ APOCYNACEAE มีชื่ออื่นๆที่ใช้เรียกตามท้องถิ่น ดังนี้ ประสงค์ เครือโทสง พระสงฆ์ จุกโรหินี นวนั่ง นอยนั่ง ต่ายานฮากหอม หยั่งสมุทรน้อย ลักษณะเป็นไม้เลื้อย ลำต้นและกิ่งมีสีน้ำตาลแดง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549) มีสรรพคุณนำทั้งต้นมาต้มแก้ท้องเสีย แก้อ่อนเพลียบำรุงกำลัง (อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2006) รากเป็นยาแก้ไอ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549) ได้มีการศึกษาทางเคมีของรากเถาประสงค์โดยการแยกสารบริสุทธิ์ พบสารประเภทคาร์ดิโนไลด์ (cardenolides)

เฮมิเทอร์พีนอยด์ (hemiterpenoids) ฟีนิลโพรพานอยด์ (phenylpropanoids) และฟีนีลเอทานอยด์ (phenylethanoids) และพบว่าสารดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะสารคาร์ดิโนไลด์ (Ueda Junya, et al, 2003) สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) คือสารที่ป้องกันหรือชะลอการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน (oxidation) ซึ่งทำให้เกิดอนุมูลอิสระ (free radical) อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อโมเลกุลของสารในร่างกาย เช่น ไขมัน โปรตีน ดีเอ็นเอ (DNA) มีงานวิจัยมากมายบ่งชี้ว่าแม้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่สามารถชะลอให้ความเสียหายเกิดช้าลงได้ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งเป็นผลลัพธ์สะสมที่เกิดจากเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายถูกทำอันตรายและเสียหายเป็นเป็นเวลาหลายสิบปี ดังนั้นบุคคลทุกเพศทุกวัยจึงควรได้รับสารต้านอนุมูลอิสระให้พอเพียง (มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 2548) สารต้านอนุมูลอิสระมีความสำคัญต่อร่างกายทำให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรค การมีสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน (โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์, ม.ป.ป) โดยเฉพาะการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชทั้งสองยังไม่มีรายงานการวิจัย ดังนั้นการวิจัยในด้านการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอบเชยเถาและเถาประสงค์ จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ และด้านการรักษาพรรณพืช ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอบเชยเถาและเถาประสงค์

## วิธีการทดลอง

พืชที่ใช้ในการวิจัย คือ ลำต้นของอบเชยเถา และใบของเถาประสงค์ โดยเก็บอบเชยป่าจากจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 และเก็บเถาประสงค์จากจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 การเตรียมสารสกัดพืชอบเชยเถาและเถาประสงค์ นำพืชตากในที่ร่มให้แห้งบดให้ละเอียด ทำการสกัดด้วยเฮกเซน (hexane) โดยใช้เครื่องสกัดซอกเล็ต (soxhlet extractor) นำสารละลายที่ได้จากการสกัดมาระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหย (rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบเฮกเซน (crude hexane extract) นำกากที่ได้จากการสกัดด้วยเฮกเซนมาสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) จะได้สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน (crude dichloromethane extract) นำกากที่ได้จากการสกัดด้วยไดคลอโรมีเทนมาสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท (ethyl acetate) จะได้สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตท (crude ethyl acetate extract) นำกากที่ได้จากการสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมาสกัดด้วยเอทานอล (ethanol) จะได้สารสกัดหยาบเอทานอล (crude ethanol extract) การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดอบเชยเถา และเถาประสงค์เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ โดยวิธี TLC (Thin Layer Chromatography) นำสารสกัดมาทำการวิเคราะห์โดย TLC จากนั้นนำ TLC chromatogram ที่ได้มาป้ายด้วยสารละลาย DPPH (0.2% 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ในเอทานอล) ถ้าสารสกัดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จะเปลี่ยนสีม่วงของ DPPH ให้จางลง

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดอบเชยเถาและเถาประสงค์เชิงปริมาณ วิเคราะห์ โดยวิธี DPPH radical scavenging assay ทำการทดสอบตามวิธีของ Yen และ Hsieh (1997) นำสารสกัดมาเตรียมเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ กันในเอทานอล ปริมาตร 0.5 ml เติมสารละลาย 0.2 mm DPPH ในเอทานอล ปริมาตร 1 ml ผสมให้เข้ากัน เก็บไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm ทำการเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ใช้เอทานอลแทนสารสกัด นำค่าที่วัดได้มาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การดักจับอนุมูล DPPH. (%scavenging) จากสมการ

$$\% \text{scavenging} = [(A_{\text{control}} - A_{\text{sample}}) / A_{\text{control}}] \times 100$$


$A_{\text{sample}}$  = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ

$A_{\text{control}}$  = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม


จากนั้นคำนวณหาค่า  $IC_{50}$  (ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถดักจับอนุมูล DPPH. ได้ 50%) จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %scavenging กับความเข้มข้นของสารสกัด

## ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง


ทำการสกัดอบเชยเถาและเถาประสงค์ด้วยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และเอทานอล โดยใช้เครื่องสกัดขอกเลต ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตท และสารสกัดหยาบเอทานอล โดยอบเชยเถามีเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบต่อน้ำหนักพืชแห้งคือ 7.79, 0.71, 2.13 และ 33.56% ตามลำดับ ในขณะที่เถาประสงค์มีเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบต่อน้ำหนักพืชแห้งคือ 5.70, 2.32, 1.74 และ 9.13% ตามลำดับ นำสารสกัดหยาบทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงคุณภาพวิเคราะห์ใช้วิธี TLC และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณวิเคราะห์ใช้วิธี DPPH radical scavenging assay แล้วหาค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50% ( $IC_{50}$ ) เทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานวิตามินซี พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของอบเชยเถาและเถาประสงค์ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่า  $IC_{50}$  เท่ากับ 2.64 และ 4.35  $\mu\text{g/ml}$  ตามลำดับ ในขณะที่วิตามินซีมีค่า  $IC_{50}$  เท่ากับ 2.61  $\mu\text{g/ml}$  ดังรูปที่ 1 2 และ 3



รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %scavenging กับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบอบเชยเถาด้วยเอทานอล



รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %scavenging กับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบเถาประสงค์ด้วยเอทานอล



**รูปที่ 3** กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %scavenging กับความเข้มข้นของวิตามินซี

จากผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดอบเชยเถาและเถาประสงค์ พบว่า อบเชยเถาและเถาประสงค์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี โดยเฉพาะอบเชยเถามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีมาก โดยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับวิตามินซี

### กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

## เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2549. **เถาประสงค์** (ออนไลน์). แหล่งเข้าถึง : <http://localbio.mnre.go.th>. 20 มีนาคม 2554.
- ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2010). **อบเชยเถา** (ออนไลน์). แหล่งเข้าถึง : <http://www.pharmacy.mahidol.ac.th>. 20 กุมภาพันธ์ 2554.
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.ม.ป.ป. **ผักพื้นบ้าน** (ออนไลน์). แหล่งเข้าถึง : <http://www.suandusitcuisine.com>. **มูลนิธิมอชาวบ้าน**. 2548. **สารต้านอนุมูลอิสระจำเป็นต่อร่างกายอย่างไร** (ออนไลน์). แหล่งเข้าถึง : <http://www.doctor.or.th>. 346, 1 มิถุนายน 2554.
- โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์. ม.ป.ป. **ตะเบียนพรรณไม้** (ออนไลน์). แหล่งเข้าถึง : <http://school.obec.go.th>. 20 มีนาคม 2554.
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2010. **อบเชยเถา** (ออนไลน์). แหล่งเข้าถึง : <http://thrai.sci.ku.ac.th>. (1663). 20 กรกฎาคม 2554.
- อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2006). **เถาประสงค์** (ออนไลน์). แหล่งเข้าถึง : <http://kanchanapisek.or.th>. 20 มีนาคม 2554.
- Chansakaow S., Phadungcharoen T., Ruangrunsi N., Toshikazu Sekine. and Isamu Murakoshi. (1993). **Constituents of *Atherolepis pierrei***. ไทยเภสัชสาร. 17(4) : 195-199.
- Ueda Jun-ya, Tezuka Yasuhiro, Banskota Arjun Hari, Tram Quan Le, Tram Qui Kim, Saiki Ikuo and Kadota Shigetoshi. (2003). **Antiproliferative activity of card enolides isolated from *Streptocaulon junventas***. Biological & pharma ceutical bulletin. 26 : 1431-1435.
- Yen GC. and Hsieh CL (1997). **Antioxidant effects of dopamine and related compounds**. J. Biotechnol. Biochem. 61(10) : 1646-1649.